

# Bayocide®

Bredspektret desinfektionsmiddel

Til desinfektion af alle overflader i stalde - også i stalde med dyr.

Dræber udskilte æg fra indvoldsorm, coccidier m.v.


Testet og godkendt ifølge retningslinierne "Guidelines for testing chemical disinfectants" fra DVG (Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft):



Mod ormeæg (*Ascaris suum*)

2% - 2 timer

- Mod svinets coccidie-æg (*Isospora suis*)  
2% - 2 timer
- Mod andre coccidie-æg (*Eimeria tenella*)  
3% - 4 timer
- Mod cryptosporidie-æg  
3% - 1 time
- Mod Clostridie-sporer  
4% - 1 time
- Mod bakterier, virus og svampe  
1% - 30 minutter



Ny brugervenlig anvendelse: SKUM-PÅFØRING



- Hurtig at påføre
- Tilsluttes den almindelige vandforsyning
- Ingen højtryks-rensning - ingen overførsel af smitstoffer med luftbårne dråber
- Kan benyttes i stalde med dyr
- Automatisk dosering af koncentrationen ved valg af dyse
- Let at se, hvor man er kommet til



Tlf. 45 23 50 00


# Bayocide®

Special-desinfektionsmiddel til overflader i stalde  
- mod parasitæg, bakterier, sporer, svampe og virus

Mod *Isospora suis* og *Eimeria* oocyster og ormeæg (*Ascaris suum* oocyster) anvendes Bayocide® i en brugskoncentration på 2%, der anvendes 0,4 l brugsopløsning pr. m<sup>2</sup>. Ved desinfektion bør vægge og stadsdskillelser desinficeres op til 1 m's højde.

Pakningsstørrelse	Vejl. udsalgspris ex. moms pr. 26.01.2011	Ved 2% opløsning rækker 2 liter til:
2 liter	kr. 384,74	250 m <sup>2</sup>

Bayocide® anvendes med en Hygienist® skum-applikator, som koster kr. 688,44

**Hygienist®** 

## Bayocide®

Special-desinfektionsmiddel til overflader i stalde  
- mod parasitæg, bakterier, sporer, svampe og virus

**2 liter**

**Anvendelse:**  
Bayocide® er et desinfektionsmiddel til anvendelse på overflader i stalde. Skumpåføring anbefales (benyt Menno desinfektions-applikator). Ved skumpåføring kan Bayocide® anvendes i stalde med dyr. Må ikke anvendes på dyr.

**Brugskoncentration og virkningstid:**

Spoleormeæg:	2 %	i 2 timer
Svinets coccidier:	2 %	i 2 timer
Andre coccidier:	3 %	i 4 timer
Cryptosporidier:	3 %	i 1 time
Clostridier:	4 %	i 1 time

Bakterier, Virus, Svampe

Anvend 0,4 liter brugsopløsning pr. m<sup>2</sup> flade.

Bayocide® er afprøvet og optaget i DVG's (Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft) liste over desinfektionsmidler med virkning på Tuberkulose, ormeæg og coccidier.


Tom emballage behandles som produktaffald. Rester af produktet afleveres til kommunal modtagestation.

**OPBEVARES FROSTFRIT**

**Indhold:**  
Aktiv stof: 25% p-Chlor-m-cresol  
Produktet må kun anvendes erhvervsmæssigt.

**Forsigtighedsregler:**  
Brandfarlig. Farlig ved indtagelse. Ætsningsfare. Risiko for alvorlig øjenskade.  
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.  
Ved ulykkestilfælde eller ved ldebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.  
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

PR-XXXXXX

  
C - Ætsende

Importør: Bayer A/S  
Nørgaardsvej 32  
2800 Lyngby  
Tlf. 45 23 50 00

**Bayer** 