

Information til dyrlægen

Profender Tabletter er et lægemiddel til hunde, der har eller risikerer at få parasitære blandingsinfektioner med rund- og bændelorm.

Indhold:

Profender Tabletter til mellemstore hunde: 10 mg emodepsid + 50 mg praziquantel.
Profender Tabletter til store hunde: 30 mg emodepsid + 150 mg praziquantel.

Lægemiddelform:

Tablet med modificeret udløsning.
Brun, kødbensformet tablet med delekærv på begge sider.
Tabletten kan deles i 2 lige store halvdele.

Profender Tabletter er tilsat smag, og hunde indtager dem normalt uden foder.

Indikationer:

Relevante endoparasitter		Virkningsdybde			
		Udviklingsstadier			
		Adult stadie	Immatur adult stadie	L4-stadie larve	L3-stadie larve
Spektrum Nematoder	<i>Toxocara canis</i>	✓	✓	✓	✓
	<i>Toxascaris leonina</i>	✓	✓	✓	
	<i>Uncinaria stenocephala</i>	✓	✓		
	<i>Ancylostoma caninum</i>	✓	✓		
	<i>Trichuris vulpis</i>	✓	✓		
Spektrum Cestoder	<i>Echinococcus multilocularis</i>	✓	✓		
	<i>Echinococcus granulosus</i>	✓	✓		
	<i>Dipylidium caninum</i>	✓			
	<i>Taenia spp.</i>	✓			

Dokumenteret og godkendt effekt
 Eksisterer kun i mellemvært

Dosering:

Anbefalet minimumsdosis er 1 mg/kg legemsvægt emodepsid og 5mg/kg legemsvægt praziquantel i henhold til følgende tabel:

Vægt	Mellemstore hunde	Store hunde
2,5 kg - 5 kg	1	
5 kg - 10 kg	2	
10 kg - 15 kg	3	
15 kg - 20 kg	4	
20 kg - 30 kg		1
30 kg - 45 kg		2
45 kg - 60 kg		3
60 kg - 75 kg		4

En enkel dosis pr. behandling er tilstrækkelig.



Bivirkninger:

Sikkerheden for brugen af Profender Tabletter er blevet testet hos et stort antal hunderacer ved adskillige kliniske undersøgelser. Erfaring og undersøgelsesresultater viser, at bivirkninger kun opstår yderst sjældent, når dosering er sket efter forskrift. Visse racer (Collier, Sheltier, Australiske Shepherds) og hunde med påvist mdr1 mutation har dog en øget incidens af bivirkninger.

Overdosering:

Symptomer er af centralnervøs karakter, er helt reversible uden behandling og forbigående i løbet af et halvt til et helt døgn. Der er ingen kendt antidot.

Særlige forholdsregler ved administration:

Gives kun til fastende hunde. Det anbefales for eksempel, at hunden faster over natten, hvis den skal behandles den efterfølgende morgen. Foder kan gives efter 4 timer og fremefter efter behandling.



Ved behandling af *D. caninum*-infektioner bør samtidig behandling af mellemvæster såsom lopper og lus overvejes, for at forhindre geninfektion.

Kontraindikationer:

Bør ikke anvendes til hvalpe yngre end 12 uger, eller som vejer mindre end 1 kg.

Anvendelse under drægtighed eller laktation:

Lægemidlets sikkerhed ved brug under drægtighed og laktation er ikke undersøgt, og kan derfor som udgangspunkt ikke anbefales.



Overdosering: Forbigående muskulær tremor, dårlig koordination og nedstemthed er set i enkelte tilfælde efter overdosis på op til 5 gange den rekommanderede dosis. Hos mdr1 mutant (-/-) Collier, er sikkerhedsmargen lavere end sammenlignet med en normal hundepopulation, og mild forbigående tremor og/eller ataxi er set i enkelte tilfælde efter overdosis på 2 gange den rekommanderede dosis. Symptomerne var helt reversible uden behandling. Føde kan øge incidensen og intensiteten af sådanne overdoseringssymptomer, og lejlighedsvis kan opkastning forekomme. Der er ingen kendt antidot. **Interaktion:** Emodepsid er et substrat for P-glycoprotein. Samtidig behandling med andre lægemidler, der er P-glycoproteinsubstrater/hæmmere (f.eks. ivermectin og andre antiparasitære makrocycliske laktoner, erythromycin, prednisolon og ciclosporin) kan forårsage farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner. Eventuelle kliniske konsekvenser af sådanne interaktioner er ikke undersøgt. **Pakninger og priser pr. 1. april 2010:** (apotekets udsalgspris til ikke erhverv inkl. moms): Profender Tabletter til mellemstore hunde: 2 tabletter: kr. 104,90, 24 tabletter: kr. 821,75. Profender Tabletter til store hunde: 2 tabletter: kr. 163,90, 24 tabletter: kr. 1241,25. For dagsaktuel pris henvises til www.medicinpriser.dk. **Indehaver af markedsføringstilladelse:** Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland. **Udlevering:** B. Ovenstående tekst er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresumet kan vederlagsfrit rekvireres fra Bayer HealthCare, Division Animal Health.