

Pakningsstørrelser



Profender til killinger og katte mellem 0,5 - 2,5 kg



Profender til katte mellem 2,5 - 5 kg



Profender til katte mellem 5 - 8 kg



Doserings- og behandlingstabel

Vægt	Pipetestørrelse
0,5 kg - 2,5 kg	Til små katte
2,5 kg - 5 kg	Til mellemstore katte
5 kg - 8 kg	Til store katte



For katte over 8 kg legemsvægt anvendes en praktisk kombination af engangspipetterne.

Profender kan bruges under drægtighed og diegivning.

Profender® spot-on, opløsning til kat (indeholder pr. ml: 21,4 mg emodepsid og 85,8 mg praziquantel)

Indikation: Til katte der har eller risikerer at få parasitære blandingsinfektioner forårsaget af rundorm og bænelorm. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes til killinger under 8 uger eller som vejer mindre end 0,5 kg. **Drægtighed og laktation:** Kan anvendes under drægtighed og laktation. **Forsigtighedsregler:** Kun til brug på hudoverfladen og på uskadt hud. Må ikke gives oralt eller parenteralt. Undgå at den behandlede kat eller andre katte i huset slikker på påføringsstedet, mens det er vådt. Der er begrænset erfaring med brug af præparatet til syge og svækkede dyr, derfor må det kun anvendes til sådanne dyr efter en risk-benefit vurdering.

Bivirkninger: Savlen og opkastning kan lejlighedsvis forekomme. Dette synes at forekomme, hvis katten slikker på påføringsstedet lige efter behandling. **Interaktion** med andre lægemidler og andre former for interaktion: Behandling samtidig med andre lægemidler, der er P-glycoprotein substrater/hæmmere (f.eks. ivermectin og andre antiparasitære makrocycliske lactoner, erythromycin, prednisolon og ciclosporin) kan i teorien forårsage farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner. **Administrationsmåde:** Kun til brug på huden.

Dosering: Katte på 0,5-2,5 kg: 1 pipette a 0,35 ml; 2,5-5 kg: 1 pipette a 0,7 ml; 5-8 kg: 1 pipette a 1,12 ml; over 8 kg: kombination af pipetter. En enkelt påføring pr. behandling er tilstrækkelig. **Overdosering:** Savlen, opkastning og neurologiske symptomer (tremor) blev lejlighedsvist set på voksne katte efter brug af op til 10 gange anbefalet dosis, og på killinger der blev behandlet med op til 5 gange anbefalet dosis. Ingen specifik modgift er kendt. **Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr:** Læs indlægssedlen inden brug. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Undgå direkte kontakt med påføringsstedet, mens det er vådt. Hold børn væk fra behandlede dyr i denne periode. Vask hænder efter brugen. Børn bør ikke have langvarig tæt kontakt (f.eks. under søvn) med behandlede katte i de første 24 timer efter påføring af præparatet. Hyppige brugere af præparatet (f.eks. dyrlæger og professionelle katteavlere) bør bruge engangshandsker ved påføring af præparatet. Selvom præparatet blev godt tolereret af drægtige katte antyder undersøgelser på rotter og kaniner, at emodepsid kan gribe ind i embryyo-foster udviklingen. Derfor bør kvinder i den fertile alder undgå kontakt med produktet, når det påføres, eller bruge engangshandsker.

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Profender® kan forårsage pletter på visse materialer, såsom læder, tekstiler, plast og polerede overflader. Lad derfor behandlingsstedet tørre, inden der bliver mulighed for kontakt med sådanne materialer. **Pakninger og priser pr. 11. februar 2008:** (apotekets udsalgspris til ikke erhverv inkl. moms, veterinær- og recepturgebyr): 2 pipetter a 0,35 ml: kr. 98,35, 2 pipetter a 0,70 ml: kr. 143,20, 2 pipetter a 1,12 ml: kr. 147,65, 40 pipetter a 0,35 ml: kr. 1358,60, 40 pipetter a 0,70 ml: kr. 1706,60, 40 pipetter a 1,12 ml: kr. 2160,25. For dagsaktuel pris henvises til www.medicinpriser.dk.

DKC080811, 3 bondes 08



Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby
Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.dk
www.vet.bayer.dk

Bayer HealthCare
Animal Health

Information til katteejeren

Kort og godt!

profender®
SPOT-ON
emodepsid + praziquantel



Bayer HealthCare
Animal Health

Til kattens ejer

Din dyrlæge har ordineret Profender til din kat. Profender er et lægemiddel mod involdsorm hos katte. Midlet indeholder to aktive substanser, som tilsammen er virksomme overfor de indvoldsorm, man typisk finder hos katte i Danmark.

Rundorm:

Spolorm (*Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*)
Hageorm (*Ancylostoma tubaeforme*)



Bændelorm:

Kattens bændelorm (*Taenia taeniaeformis*)
Bændelorm overført via lopper (*Dipylidium caninum*)
Rævens dværgbændelorm (*Echinococcus multilocularis*)



En enkelt behandling er nok til at dræbe de orm, der eventuelt måtte husere i katten.

Sådan virker Profender


Kort tid efter påføring af Profender optages de aktive stoffer gennem kattens hud.

De aktive stoffer transporteres dernæst til de områder, hvor parasitterne lever (oftest i tarmen).

Parasitterne dør, når de kommer i kontakt med de aktive stoffer. De døde indvoldsorm udskilles typisk sammen med afføringen, men kan sjældent ses, da parasitterne ofte er opløst.

Profender er specielt udviklet til kattens hud og trænger ikke igennem huden på mennesker.

Profender kan også bruges til drægtige og diegivende katte, samt killinger helt ned til 8 ugers alderen (vejende fra 500 gram).



Profender er enkel at give til din kat



Hold pipetten lodret og skru låget af. Brug enden af låget til at prikke hul i pipetten.



Del pelsen på kattens nakke med fingrene så huden bliver synlig.



Sæt spidsen af pipetten på den synlige hud, og tryk gentagne gange på pipetten så hele indholdet tømmes på huden. Vask hænderne efter brug.