

Dyrlægens anvisninger:

Følg altid dyrlægens anvisninger og læs altid indlægssedlen grundigt før brug.

Dosering/genbehandling:

.....

.....

Supplerende behandling:

.....

.....

Kontrol/genbesøg aftalt:

.....

.....

Min hund har skab!!

Informationsblad fra Bayer A/S vedrørende skab hos hund



Hvad er skab hos hund?

Skab er et mide-angreb i huden.

Hos hunde er det en oftest den mide, der hedder *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, der er årsagen til lidelsen. Miden er kun 0,2 mm stor med en kort plump krop og korte ben med sugekopper. Miderne parrer sig på hudoverfladen, og hunnerne graver sig ned i gange i huden. Her lægger de 2-4 æg dagligt. Udviklingen fra æg til kønsmoden mide tager ca. tre uger.

Hvordan har min hund fået skab?

Skab smitter ved direkte kontakt, eller ved at hunden kommer i kontakt med materiale fra f.eks. smittede ræve. Dette sker typisk i højere grad om vinteren, da rævene kommer betydeligt tættere til beboelser end om sommeren. Samtidig er de angrebne ræve svagere end de øvrige, og derfor søger de mod gemmesteder, som f.eks. kan være under en terrasse eller lignende. Ræve, der har skab, vil være tilbøjelige til at gnubbe sig op ad træ eller lignende, og derved afgive mider til omgivelserne. Miderne kan leve i 2-6 dage ved stuetemperatur, og ved 10-15°C grader kan miderne leve i op til tre uger ved gunstig luftfugtighed.

Hvad med smitte til andre hunde?

Den hyppigste smitte antages at komme fra omgivelserne, men smitte hunde imellem ses også. Hvis naboens eller (en af) ens egne hunde har fået skab, er det derfor vigtigt at holde den/dem fra andre hunde i en periode, samt at behandle alle hunde, der har været sammen med den pågældende hund.

Hvad med smitte til mennesker?

Ved tæt kontakt med angrebne dyr kan mennesker smittes med ræveskab, men infektionen etablerer sig ikke på samme måde som hos hunden og forsvinder ofte af sig selv. Hos mennesker ses flere intenst kløende knopper, typisk på arm og ryg/mave. Hundens og rævens skabmide må ikke forveksles med den variant, der har mennesker som hovedvært (fnatmiden).



Hvad med smitte til katte?

Der kan ses skab hos kat med hundens/rævens skabmide; men det er relativt sjældent.

Hvor lang tid efter behandling smitter min hund?

Generelt sker der et betydeligt midedrab efter behandlingsstart. Efter en uge vil der være så få mider tilbage, at smitterisikoen kun er lille. Efter en måned vil de fleste hunde være helt smittefrie.

Hvordan stilles diagnosen?

Skab giver sig ofte til kende ved en intens kløe, ofte lokaliseret ved hoved (især ører) og lemmer (has-, albue- og poteregionen). Kløen er voldsommere end ved andre hudlidelser, og i kombination med de hudforandringer der ses, giver hele dette billede en ide om, at det kan være skab. Derudover kan dyrlægen stille diagnosen ved at skrabe i huden og finde mider samt æg. Ofte er dette den mest simple og effektive måde at stille diagnosen på, men i visse tilfælde kan det være vanskeligt at påvise miderne på trods af, at hunden har skab. Diagnosen kan også stilles ved hjælp af en blodprøve, men dette kræver, at hunden er 2-3 uger inde i forløbet.



Forben angrebet af skab

Hvad kan der gøres?

Undersøg om der er en ræv, der har et gemmested i haven, eller hvor hunden luftes. Sørg for at hunden ikke ruller sig der eller på anden måde øger mulighederne for kontakt med smitemateriale.

Lad være med at fodre rævene.

Gå til dyrlægen og følg dennes anvisninger vedrørende behandling.

Ræveskab er en meget ubehagelig lidelse, men hvis der behandles korrekt og rettidigt, er der ingen fare for hundens fortsatte helbred.

Der er forskellige behandlingsmuligheder, og under alle omstændigheder skal man belave sig på, at der går nogen tid, inden problemet er helt løst. Samtidig skal man være opmærksom på, at der til stadighed er mulighed for gensmitte, hvis der er skab i området.

Vaskebehandling med speciel utøjsvask (recept) kan bruges. Denne behandlingsform er meget effektiv med hensyn til en hurtig effekt. Til gengæld er det besværligt og kræver, at der er mulighed for at vaske under udluftning osv.

I dag er der endvidere mulighed for at behandle med spot-on (pipette) i nakken på hunden (recept). Denne behandling er nem at give, og der kræves min. 2 behandlinger med en måneds mellemrum, før hunden er helt fri for skab.

Ved skabbehandling kan der ses kløe i perioden efter, at behandlingen er startet op. Dette behøver ikke at være pga. manglende effekt, - måske snarere tværtimod. Ved behandlingen vil der være døde mider og cellehenfald i de gange miderne ligger i. Dette medfører en betydelig hudreaktion, som til tider nærmest kan tage karakter af allergi.

Behandlingen tager sigte på at dræbe miderne; men det kan også være nødvendigt at lindre eventuel kløe og hudreaktion.